

# INFORMACJA O PRODUKTACH



**NOWA LINIA REPARESTIM® TD**

**Prezentacja:  
opakowanie  
zawierające 5 fiolek**

**HA**



- Naprawia
- Wypełnia
- Stymuluje

**Oczy**



Poprawia wygląd konturów oczu

**Relaksacja  
skóry**



- Przeciwdziała starzeniu
- Relaksuje

**Rozjaśnianie**



Działanie rozjaśniające

**Cellulit**



Normalizuje wygląd cellulitu  
oraz elastyczność skóry

**Rozstępy**




- Likwidacja rozstępów
- Stymulacja aktywności komórek

**Włosy**



Nowa energia  
dla Twoich włosów



Reparestim® Hair TD

Reparestim® Hair TD

Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Eyes TD - Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Eyes TD - Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Whitening TD (pigment control)

Reparestim®HA CE\* - Reparestim®HA TD

Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim®HA CE\* - Reparestim®HA TD

Reparestim®HA CE\* - Reparestim®HA TD

Reparestim®HA CE\* - Reparestim® Skin Relax TD

Reparestim® Whitening TD (pigment control)

Reparestim®HA CE\* - Reparestim® Skin Relax TD

## NEW REPARESTIM® TD LINE

Twarz  
Szyja  
Dekolt

Kompletna mapa wskazań

Poprawia wygląd konturów oczu

REPARESTIM® EYES TD



Produkt:



fiolka 3 ml / 5 fiolek w pudełku

Wskazania:

- Zmniejszenie opuchlizny wokół oczu
- Poprawa wyglądu worków pod oczami
- Wygładzenie konturów oczu
- Poprawa elastyczności skóry
- Działanie antyoksydacyjne
- Działanie rozjaśniające

Średnia ilość na sesję:

0,5 ml na **obszar**, maksymalnie 1,25 ml na sesję dla obu konturów oczu

Program aplikacji:

mezoterapia mikroigłowa, **AD Roll**, **ExcellDerm Pro**, elektroporacja, elektroforeza, jonoforeza lub inne techniki nieinwazyjne poprawiające biodostępność produktów w skórze

Częstotliwość:

1 sesja tygodniowo  
1 program = średnio 4 sesje

Zalecana liczba sesji:

powtarzać program 1-3 razy w roku

Połączenia z innymi zabiegami estetycznymi:

- Reparestim Eyes TD można zastosować 1 tydzień przed **peelingiem Easy Phytic**
- Reparestim Eyes TD można łączyć z produktami **biorewitalizacyjnymi** zawierającymi kwas hialuronowy (Reparestim HA CE)
- Reparestim Eyes TD może poprawić skuteczność innych **urządzeń medycznych** stosowanych przeciw rozstępom
- **ExcellDerm Pro po zastosowaniu Reparestim Eyes TD**: działanie synergistyczne

Codzienna pielęgnacja:

**AD Daily Care Eyes** (dostępny wkrótce) 2 razy dziennie, 24 dni

# Oczy



Poprawia  
wygląd  
konturów oczu

1 opakowanie  
5 fiolek x 3 ml  
10 zabiegów

	Wit. C (fosforan sodowy kwasu askorbinowego)	Trokserutyna	Ruszczyk	Cytrus	Nawłóć	Dipeptyd-2	Peptyd Pal- CQPR	Kasztanowiec (escyna)	Nostrzyk	Resweratrol + Winorośl właściwa	Krzem organiczny	Kwas hialuronowy
Drenaż limfatyczny (+)												
Elastyczność skóry (+)												
Synteza kolagenu (+)												
Hamowanie tyrozynazy												
Reduktor melaniny												
Obrzęk powiek (-)												
Aktywator sirtuin (ogólne przeciwdziałanie starzeniu)												
Działanie diuretyczne												
Zmniejszenie mikrolepkości krwi												
Działanie lipolityczne												
Działanie flebotoniczne												
Przepuszczalność naczyń (-)												
Działanie przeciwzapalne												
Wazokonstrykcja												
Przeciwdziałanie starzeniu												
Działanie antyoksydacyjne												
Wymiana komórek naskórka (+)												
Transport molekularny												
Antyhialuronidaza												

(+) wzrost (-) spadek



Przeciwdziałanie starzeniu  
Relaksacja

REPARESTIM® SKIN RELAX TD

Produkt:



fiolka 5 ml / 5 fiolek w pudełku

Wskazania:

- Zwiększenie odprężenia i miękkości skóry
- Wygładzenie powierzchni skóry
- Nawilżenie skóry, skóra miękka w dotyku i wyglądzie

Średnia ilość na sesję:

1,5 ml na **obszar**, maksymalnie 5 ml na sesję

Program aplikacji:

mezoterapia mikroigłowa, **AD Roll**, **ExcellDerm Pro**, elektroporacja, elektroforeza, jonoforeza lub inne techniki nieinwazyjne poprawiające biodostępność produktów w skórze

Częstotliwość:

1-2 sesje tygodniowo  
1 program = średnio 4 sesje

Zalecana liczba sesji:

powtarzać program 3-5 razy w roku

Połączenia z innymi zabiegami estetycznymi:

- Reparestim Skin Relax TD można zastosować 1 tydzień przed **peelingiem Easy Phytic**
- Reparestim Skin Relax TD można łączyć z produktami **biorewitalizacyjnymi** zawierającymi kwas hialuronowy (Reparestim HA CE)
- Reparestim Skin Relax TD może poprawić skuteczność innych **urządzeń medycznych** stosowanych przeciw rozstępom
- **ExcellDerm Pro po zastosowaniu Reparestim Skin Relax TD**: działanie synergistyczne

Codzienna pielęgnacja:

**AD Daily Care Skin Relax** 2 times a day, 24 days

Działanie rozjaśniające

REPARESTIM® WHITENING TD



Produkt:



fiolka 5 ml / 5 fiolek w pudełku

Wskazania:

- Wyrównanie kolorytu skóry
- Rozjaśnienie skóry
- Działanie rozświetlające
- Działanie antyoksydacyjne
- Zwiększenie wymiany komórek naskórka
- Poprawa elastyczności i nawilżenia skóry

Średnia ilość na sesję:

1,5 ml na **obszar**, maksymalnie 5 ml na sesję

Program aplikacji:

mezoterapia mikroigłowa, **AD Roll**, **ExcellDerm Pro**, elektroporacja, elektroforeza, jonoforeza lub inne techniki nieinwazyjne poprawiające biodostępność produktów w skórze

Częstotliwość:

1 sesja tygodniowo  
1 program = średnio 4 sesje

Zalecana liczba sesji:

powtarzać program tak często, jak to konieczne

Połączenia z innymi zabiegami estetycznymi:

- Reparestim Whitening TD można zastosować 1 tydzień przed **peelingiem Easy Phytic**
- Reparestim Whitening TD można łączyć z produktami **biorewitalizacyjnymi** zawierającymi kwas hialuronowy (Reparestim HA CE)
- Reparestim Whitening TD może poprawić skuteczność innych **urządzeń medycznych** stosowanych przeciw rozstępom
- **ExcellDerm Pro po zastosowaniu Reparestim Whitening TD**: działanie synergistyczne

Codzienna pielęgnacja:

**AD Daily Care Whitening** 2 razy dziennie, 24 dni

# Rozjaśnianie



Działanie rozjaśniające

1 opakowanie  
5 fiolek x 5 ml  
5-20 zabiegów

	Mącznica (Arbutyna)	Albatyna	Octan tokoferolu	Dekspantenol Palmitynian tokoferolu	Sól sodowa fosforanu askorbylu	Morwa biała	Ekstrakt z lukrecji	Kropidlak (kwas kojowy)	Kwas mlekowy	Kwas hialuronowy	Etoksydi-glikol
Tyrozynaza (RNAm) (-)	+										
Tautomeraza dopachromu (-)		+									
Etapy oksydacji (-)			+		+						
Katecholaza (-)								+			
Polimeryzacja melaniny (-)		+									
Prekursor hydrochinonu	+										
Plamy wątrobowe (-)	+				+						
Dendrytyzacja (-)								+			
Wymiana komórek naskórka (+)				+					+		
Reduktor o-chinonu					+						
Koncentracja aktywnych komórek warstwy podstawnej											+
Działanie przeciwzapalne							+				
Reduktor melaniny					+						
Działanie antyoksydacyjne			+		+			+			
Eu=> feomelanina								+			
Transport molekularny										+	
Przeciwdziałanie starzeniu	+										
Hamowanie melanogenezy	+	+			+	+	+	+			


(+) wzrost (-) spadek



## NOWA LINIA REPARESTIM® TD


Ciało

Kompletna mapa wskazań



Normalizuje wygląd cellulitu oraz elastyczność skóry

REPARESTIM® CELLULITE TD



Produkt:



fiolka 10 ml / 5 fiolek w pudetku

Wskazania:

- Naprawa „skórki pomarańczowej”
- Poprawa napięcia skóry
- Stymulacja jędrności skóry
- Zwiększenie elastyczności skóry
- Detoksykacja tkanek
- Usuwanie nadmiaru wody ze skóry
- Wzrost powierzchniowego mikrokrążenia krwi
- Nawilżanie i odżywienie skóry
- Działanie przeciworodnikowe

Średnia ilość na sesję:

10 ml na **obszar**, maksymalnie 20 ml na sesję po obu stronach

Program aplikacji:

mezoterapia mikroigłowa, **AD Roll**, **ExcellDerm Pro**, elektroporacja, elektroforeza, jonoforeza lub inne techniki nieinwazyjne poprawiające biodostępność produktów w skórze

Częstotliwość:

1 sesja tygodniowo  
1 program = średnio 4-6 sesji

Zalecana liczba sesji:

powtarzać program 1-3 razy w roku

Połączenia z innymi zabiegami estetycznymi:

- Reparestim Cellulite TD można zastosować 1 tydzień przed **peelingiem Easy Phytic**
- Reparestim Cellulite TD można łączyć z produktami **biorewitalizacyjnymi** zawierającymi kwas hialuronowy (Reparestim HA CE)
- Reparestim Cellulite TD może poprawić skuteczność innych **urządzeń medycznych** stosowanych przeciw cellulitowi
- **ExcellDerm Pro** po zastosowaniu Reparestim Cellulite TD: działanie synergistyczne

Codzienna pielęgnacja:

**AD Daily Care Cellulite** (dostępny wkrótce) 2 razy dziennie, 24 dni

# Cellulit



Normalizuje  
wygląd cellulitu  
oraz elastyczność  
skóry

1 opakowanie  
5 fiolek x 10 ml  
5 zabiegów

	Kofeina	Trokserutyna	Karczoch zwyczajny	Krzem organiczny	L-karnityna	Wąkrota azjatycka	Morszczyk Pęcherzyk.	Bluszcz pospolity	Ruszczyk kolczasty	Kwas hialuronowy
Działanie lipolityczne					kofaktor					
Działanie flebotoniczne										
Działanie przeciwobrzękowe										
Zmniejszenie mikrolepkości krwi										
Eliminacja toksyn										
Flawonoidy										
Kwasy fenolowe Polifenole Przeciwutleniacze										
Działanie diuretyczne										
Elastyczność włókien (+)										
Kolagen (+)										
Glikozaminoglikany(+)										
Transport tłuszczu										
Lokalne stwardnienie (-)										
Transport molekularny										
Skórka pomarańczowa (-)										

(+) wzrost (-) spadek

Likwidacja rozstępów,  
Stymulator aktywności komórek

REPARESTIM® STRETCH MARKS TD

Produkt:



fiolka 10 ml / 5 fiolek w pudetku

Wskazania:

- Poprawa reepitelializacji
- Poprawa napięcia i elastyczności skóry
- Poprawa objętości i nawilżenia skóry
- Ujędrnienie skóry
- Aktywna poprawa wytwarzania nowych komórek skóry
- Poprawa jakości macierzy międzykomórkowej i ogólnego metabolizmu skóry
- Poprawa gęstości i jakości skóry
- Immunomodulacja i działanie antyoksydacyjne

Średnia ilość na sesję:

5 ml na **obszar**, maksymalnie 10 ml na sesję

Program aplikacji:

mezoterapia mikroigłowa, **AD Roll**, **ExcellDerm Pro**, elektroporacja, elektroforeza, jonoforeza lub inne techniki nieinwazyjne poprawiające biodostępność produktów w skórze

Częstotliwość:

1 sesja tygodniowo  
1 program = średnio 4-6 sesji

Zalecana liczba sesji:

powtarzać program 1-3 razy w roku

Połączenia z innymi zabiegami estetycznymi:

- Reparestim Stretch Marks TD można zastosować 1 tydzień przed peelingiem **Easy Phytic**
- Reparestim Stretch Marks TD można zastosować przed **peelingiem Easy TCA** (pomiędzy peelingami lub bezpośrednio przed peelingiem)
- Reparestim Stretch Marks TD można łączyć z produktami **biorewitalizacyjnymi** zawierającymi kwas hialuronowy (Reparestim HA CE)
- Reparestim Stretch Marks TD może poprawić skuteczność innych **urządzeń medycznych** stosowanych przeciw rozstępom
- **ExcellDerm Pro** po zastosowaniu Reparestim Stretch Marks TD: działanie synergistyczne

Codzienna pielęgnacja:

**AD Daily Care Stretch Marks** (dostępny wkrótce) 2 razy dziennie, 24 dni

# Rozstępy



- Likwidacja rozstępów
- Stymulator aktywności komórkowej

1 opakowanie  
5 fiolek x 10 ml  
5-10 zabiegów

	Nano bFGF (podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów) Ludzki oligopeptyd 3	Wit. C fosforan sodowy kwasu askorbinowego)	Krzem organiczny	Polinukleotydy – DNA –	Wąkrota azjatycka	Ekstrakt z soi	Polifenole (ekstrakt z owsa)	Kwas hialuronowy	Sole mineralne (Ca-Mg-P-I-K-Ca Co-Zn-Mn-Al-Fe)	Witaminy (A-B1-B2-PP-D)
Działanie przeciwzapalne [Interleukiny (-)]										
Melanogeneza (-)										
Mikrokrążenie (+)										
Epitelializacja (+)										
Stymulacja gojenia										
Działanie flebotoniczne										
Lokalne stwardnienie (-)										
Elastyczność skóry (+)										
Jędrność skóry (+)										
IL-6 - IL-10 (-) (działanie przeciwzapalne)										
Przeciwutleniacz										
Biosynteza (+)										
Stymulacja fibroblastów										
Synteza glikozaminoglikanów (+)										
Filtr skórny										

(+) wzrost (-) spadek

# ExcellDerm® Pro

## WSKAZANIA

---

ExcellDerm® Pro to niezawodna technika przeznaczona dla licznych wskazań, umożliwiającą przeprowadzanie wielu zabiegów w bezbolesny sposób.

### Twarz:

---

- Przeciwdziałanie starzeniu
- Brak jędrności
- Ostuda
- Cienie wokół oczu

### Ciało:

---

- Cellulit
- Miejscowy nadmiar tkanki tłuszczowej
- Rozstępy

### Włosy:

---

- Utrata włosów

## Korzyści urządzenia ExcellDerm® Pro w porównaniu z innymi technikami lub systemami aplikacji:

---

- **ExcellDerm® Pro** nie wykorzystuje elektroani jonoforezy, dlatego nie występuje kontakt elektryczny z pacjentem. Dzięki temu nie istnieje ryzyko poparzenia, drżenia pęczkowego mięśni, bólu lub stanu zapalnego.
- **ExcellDerm® Pro** jest techniką nieinwazyjną.
- **ExcellDerm® Pro** nie posiada elektrody zwrotnej (płytki uziemiająca). Jest to urządzenie jednobiegunowe: fale przenikają do powierzchniowych warstw skóry, ale nie przechodzą przez całe ciało pomiędzy + a – lub pomiędzy emiterym a receptorem.
- **ExcellDerm® Pro** nie wywołuje molekularyzacji aplikowanych substancji.
- **ExcellDerm® Pro** jest odpowiedni dla substancji jonowych (+, -) lub niejonowych (neutralnych); dla substancji rozpuszczalnych w wodzie lub tłuszczach.
- **ExcellDerm® Pro** pozwala uzyskać prędkość przeskórnej penetracji produktów hydro-lipidowych wynoszącą około 1 grama na 60 sekund.
- **ExcellDerm® Pro** nie wymaga żelu przewodzącego: żadne konserwanty z żelu (np. parabeny) nie przenikają do skóry.
- **ExcellDerm® Pro** jest praktyczny, przenośny i łatwy w obsłudze.
- **ExcellDerm® Pro** aplikuje substancje o dowolnej masie cząsteczkowej.
- **ExcellDerm® Pro** jest bezbolesny.
- **ExcellDerm® Pro** jest łatwy w użytkowaniu.
- **ExcellDerm® Pro** posiada przystępną cenę i przynosi duże korzyści w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.





# AD Roll

**URZĄDZENIE DO MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ SKÓRY**  
mikroperforacja naskórka

## CECHY URZĄDZENIA AD ROLL

- **Głowica:** średnica 23,80 mm (maksymalnie) x szerokość 18,20 mm (maksymalnie)
- **Dyski:** 9 dysków (540 igieł)
- **Igła:** stal nierdzewna o klasie medycznej (SUS 304)
- **Rączka:** tworzywo inżynieryjne (nadaje się do sterylizacji w autoklawie)
- Zdejmowana głowica dla utrzymania najwyższej higieny
- Sterylizacja promieniowaniem gamma

## PREZENTACJA



 **AESTHETIC DERMAL, SL**  
C/ Pla de l'Estany, 29 • 17486 Castelló d'Empúries (Girona) SPAIN  
www.aestheticdermal.com • info@aestheticdermal.com

